Literatur Review : Potensi Asam Askorbat dalam Penanganan Gangguan Kesehatan Mental

Sudana Fatahillah Pasaribu¹✉, Herviana Herviana², Fahmil Usman³
¹²³ Program Studi Pascasarjana Gizi Klinik Universitas Sebelas Maret, Indonesia

sudanafatahillah@gmail.com /082276302084

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima : 15 April 2020

Disetujui : 31 Mei 2020

Di Publikasi : 1 Mei 2021

Keywords:

asam askorbat, norepinefrin,
myelin sheath

DOI:

<https://doi.org/10.32763/juke.v14i1.208>

Abstrak

Latar belakang: Gangguan kesehatan mental menurut WHO seperti skizofrenia, depresi, cacat intelektual, penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Gangguan kesehatan mental dapat tangani dengan bermacam terapi. Asam askorbat merupakan salah satu vitamin yang berfungsi dalam penurunan masalah kesehatan mental sebab asam askorbat berperan penting dalam memberikan fungsi sebagai kofaktor enzimatis yang berpartisipasi dalam biosintesis *myelin sheath* oleh sel *schwann*, dan *norepinefrin* dalam pengaturan *mood*. **Tujuan:** Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengetahui potensi asam askorbat dalam penanganan gangguan kesehatan mental. **Metode:** Metode yang digunakan pada tinjauan literature yaitu menggunakan metode berbentuk naratif. Data diambil dari beberapa artikel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi. **Hasil:** Hasil tinjauan literatur ditemukan 4 artikel sesuai kriteria inklusi, asam askorbat di dalam otak memiliki konsentrasi sangat tinggi dibandingkan dengan organ lain, konsentrasi asam askorbat dalam otak mencapai 10 mmol / L. Berdasarkan empat penelitian menunjukkan bahwa asam askorbat dapat menurunkan gangguan kesehatan mental dikarenakan peran asam askorbat dalam pembentukan norepinefrin katekolamin, *myelin sheath* oleh sel *schwann*, pelepasan asetilkolin dan keseimbangan glutamatergik. **Kesimpulan:** Pada tinjauan literatur ini dapat disimpulkan konsumsi asam askorbat yang cukup dapat menurunkan gangguan kesehatan mental.

The Potential of Ascorbic Acid in Management of Mental Health Disorders

Abstract

Background: According to WHO, mental health disorders can be defined as schizophrenia, depression, intellectual disability, drug abuse, bipolar affective disorders, dementia, intellectual disabilities and developmental disorders including autism. Mental health disorders can be treated with many therapies. Vitamin C has a functions to reduce mental health problems because it plays an important role in providing its function as an enzymatic cofactor that participates in myelin sheath biosynthesis by Schwann cells, and norepinephrine in mood regulation. **Purpose:** The objective of this article to determine the potential of ascorbic acid in reducing mental health disorders. **Method:** Method of this article is narrative review. Data was taken from several journals that involved in inclusion criteria. **Results:** literature review results obtained from four research which stated that vitamin c can reduce the incidence of mental health disorders (p-value <0.005). Ascorbic acid in the brain has a very high concentration compared to another organs, the concentration of ascorbic acid in the brain reaches 10 mmol / L. Based on four research showed that ascorbic acid can reduce mental health disorders due to the role of ascorbic acid in the formation of catecholamine norepinephrine, myelin sheath by Schwann cells, acetylcholine coating and glutamatergic balance. **Conclusion:** Conclusion of literature review is consumption of adequate ascorbic acid can reduce mental health disorders

Alamat korespondensi:

Univeritas Sebelas Maret, Surakarta, Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta 57126, Indonesia
sudanafatahillah@gmail.com

ISSN 2597-7520

© 2021 Poltekkes Kemenkes Ternate

Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan dalam membangun kesehatan suatu negara, sebab gangguan kesehatan mental akan berdampak pada kualitas SDM suatu negara. Kesehatan mental memiliki peran sama dengan kesehatan fisik, jika optimalnya kesehatan mental dan fisik seseorang sehingga membuat kinerja menjadi maksimal (Ayuningtyas & Rayhani, 2018). Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi seorang individu tidak mampu memecahkan suatu masalah/mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya sehingga menimbulkan stress yang berlebih (WHO, 2013). Gangguan kesehatan mental menurut WHO dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku dan hubungan dengan orang lain meliputi skizofrenia, depresi, cacat intelektual, gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme (WHO, 2017b).

Proporsi populasi yang mengalami depresi di wilayah Asia Tenggara dengan prevalensi 21% dan wilayah Pasifik Barat 27% dari 322 juta kejadian depresi. Perkiraan jumlah orang yang mengalami *anxiety* di dunia adalah 264 juta, jumlah kasus ini terjadi peningkatan 14,9% sejak tahun 2005. Menurut WHO regional Asia Pasifik (WHO SEARO) jumlah kasus gangguan depresi tertinggi terjadi di India (56.675.969 kasus atau 4,5% dari jumlah populasi) dan terendah terjadi di Maldives (12.739 kasus atau 3,7% dari populasi). Sementara itu kejadian depresi di Indonesia sebanyak 9.162.886 kasus atau 3,7% dari populasi (WHO, 2017a).

Vitamin C (asam askorbat) adalah vitamin larut air yang terlibat dalam berbagai fungsi vital. Asam askorbat dalam konsentrasi tinggi banyak ditemukan pada kelenjar adrenal, otak dan sumsum tulang (Fiona *et al*, 2014). Asam askorbat berperan pada Sistem Saraf Pusat (SSP) sebagai neuromodulator glutamatergic, kolinergik, dopaminergik, dan c-aminobutyric (GABA)-ergik neurotransmisi, kofaktor, pembentukan struktur saraf, serta turut membantu dalam proses diferensiasi, pematangan, dan kelangsungan hidup saraf (Moretti, 2017). Asam askorbat berperan sebagai kofaktor enzimatis dalam biosintesis zat-zat seperti kolagen, karnitin, tirosin, hormon peptida serta pembentukan *mielin* dengan bantuan asam askorbat yang berpengaruh pada penanganan gangguan kesehatan mental (Sawicka-glazer & Czuczwar, 2014). Menurut beberapa penelitian alternatif untuk penurunan terjadinya gangguan kesehatan mental dapat dilakukan dengan pemberian vitamin C. Keterbatasan penelitian terkait asam askorbat terhadap gangguan kesehatan mental belum banyak dilakukan pada kelompok

usia tertentu. Pentingnya terapi dalam penanganan gangguan kesehatan mental menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan metode tinjauan literatur yaitu menganalisis potensi asam askorbat dalam penanganan gangguan kesehatan mental.

Metode

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur (*literature review*) dengan menggunakan metode naratif yang bertujuan mencari hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peran asam askorbat dalam penanganan gangguan kesehatan mental. Data yang diperoleh pada kajian ini diambil dari beberapa jurnal yang dipublikasi pada tahun 2016 – 2019. Sumber pencarian artikel menggunakan *google scholar*, PUBMED, MDPI dengan menggunakan kata kunci *ascorbic acid*, asam askorbat dan *mental disorder* serta melakukan penyaringan dengan melakukan kriteria inklusi yaitu artikel memiliki hasil penelitian signifikan (p -value <0.05), artikel gangguan kesehatan mental seperti (autis, psychiatric disorders, *schizophrenia*, dan *depression*) serta melakukan pemeriksaan referensi dari jurnal yang digunakan. Pada penelitian ini ditemukan empat artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi.

Hasil dan Pembahasan

Mikro nutrisi asam askorbat dalam jumlah yang cukup dalam tubuh dianggap akan dapat menurunkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, *anxiety*, demensia, autisme, gangguan aktif bipolar, cacat intelektual, dan *schizophrenia*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh asam askorbat terhadap penanganan gangguan kesehatan mental. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fraga *et al* (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen asam askorbat terhadap efek *hippocampal synaptic plasticity* (HSP). Penelitian ini juga menilai kejadian *anxiety* pada sampel dengan uji NSF dan dilakukan pada sampel tikus dengan pemberian suplemen asam askorbat 1 mg/kg, p.o dengan injeksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemberian suplemen asam askorbat sebesar 1 mg/kg, p.o dapat menurunkan kejadian *anxiety* dibandingkan kelompok kontrol (p -value = <0.001). Terjadinya penurunan kejadian *anxiety* dengan pemberian vitamin c pada tikus menunjukkan bahwa asam askorbat menimbulkan efek ansiolitik pada tikus (Fraga *et al.*, 2019).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Lopez *et al* (2016) Penelitian ini dalam pengumpulan data depresi menggunakan metode *Centre for Epidemiological Studies Depression Scale for Children* (CES-DC), dengan menggunakan 20 item gejala depresi, skor yang lebih tinggi menunjukkan kejadian depresi dengan

rentang skor yang digunakan 0-60. Pada penelitian ini diperoleh bahwa subjek yang mengalami gejala depresi memiliki asupan asam askorbat yang rendah (Rubio-lópez, Morales-suárez-varela, & Pico, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khajehnasiri *et al* (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian asam askorbat terhadap kejadian depresi. Pada penelitian ini, pengumpulan data depresi dilakukan menggunakan metode penentuan skor *Back Depression Inventory* (BDI). Pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan kriteria memiliki nilai atau skor BDI >10 lalu selanjutnya akan dilakukan intervensi. Setelah dilakukan intervensi suplemen asam askorbat 250 mg setiap 2 x/hari selama 2 bulan, maka subjek selanjutnya dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui tingkat depresi dan diperoleh hasil bahwa pekerja yang mengkonsumsi suplemen asam askorbat dapat menurunkan kejadian depresi pada pekerja (*p-value*= 0,018) (Khajehnasiri *et al.*, 2016)

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan Pasaribu dkk (2019) yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan asam askorbat dengan manifestasi klinik penyandang autisme. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh jumlah asupan asam askorbat yang dikonsumsi oleh penyandang autisme dengan menggunakan metode *food recall 24 jam* selama 6 kali dalam waktu yang tidak berturut-turut. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa asam askorbat memiliki hubungan dengan manifestasi klinik penyandang autisme (*p-value*: 0,002) dengan keeratan hubungan sedang (*-r*=0,387), sehingga semakin tinggi asupan asam askorbat akan menurunkan manifestasi klinik penyandang autisme (Pasaribu *et al.*, 2019)

Peran asam askorbat terhadap penanganan gangguan kesehatan mental juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kim *et al.*, (2017) yaitu untuk mengetahui asupan asam askorbat terhadap penderita penyakit *schizophrenia*. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data asam askorbat dengan melakukan survei kebiasaan makan dengan pemberian skor (20-100), dan semi-quantitative FFQ dengan 76 item makanan dan minuman, sampel diminta untuk memilih salah satu dari sembilan kategori, sampel diminta untuk menjelaskan berapa besar porsi yang dikonsumsi oleh sampel kemudian asupan zat gizi sampel dihitung menggunakan *Computer Aided Nutritional Analysis*. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa asupan asam askorbat yang rendah akan lebih berisiko menderita penyakit *schizophrenia* dibandingkan kontrol (Kim *et al.*, 2017).

Mekanisme Asam Askorbat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental

Asam askorbat merupakan vitamin larut air yang umumnya mampu disintesis oleh mamalia, namun manusia tidak memiliki kemampuan untuk mensintesis asam askorbat disebabkan kurangnya enzim L-gulonolactone oxidase yang berfungsi untuk melakukan metabolisme sintesis asam askorbat (Du, Cullen, & Buettner, 2012). Asam askorbat adalah nutrisi yang paling penting terhadap fungsi sistem saraf, peran utama asam askorbat di dalam otak adalah sebagai antioksidan. Terlepas peran sebagai anti oksidan, asam askorbat juga terlibat dalam berbagai proses non-oksidan seperti biosintesis kolagen, karnitin, tirosin, hormon peptida, pembentukan mielin, neurotransmisi dan pematangan fungsi neuron (Warner, Kang, Kennard, & Harrison, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sawicka (2014) yang menunjukkan bahwa asam askorbat berpengaruh terhadap penurunan tingkat keparahan terjadinya kejang (Sawicka-glazer & Czuczwar, 2014). Penelitian lain juga dilakukan oleh Tveden (2012) bahwa gangguan pada transportasi asam askorbat berpengaruh terhadap kejadian kerusakan otak pada bayi prematur (Tveden-nyborg, Vogt, Schjoldager, Jeannet, & Hasselholt, 2012).

Asam askorbat di dalam otak memiliki konsentrasi sangat tinggi dibandingkan dengan organ lain, konsentrasi asam askorbat dalam otak mencapai 10 mmol / L (Covarrubias-pinto, Acuña, & Beltrán, 2015). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kocot *et al* (2017) bahwa konsentrasi asam askorbat tinggi pada hippocampus dan neocortex di otak manusia. Asam askorbat memiliki fungsi utama di dalam otak yaitu sebagai pertahanan antioksidan sel (Kocot, Luchowska-kocot, & Musik, 2017)

Asam askorbat sangat mudah diabsorpsi di dalam usus. Asam askorbat yang telah diabsorpsi di dalam usus akan diangkut menggunakan alat transportasi *Sodium Ascorbate Cotransporter-1* (SVCT1), setelah diabsorpsi asam askorbat kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan di dalam tubuh. Konsentrasi asam askorbat paling banyak ditemukan pada kelenjar adrenal, otak dan sumsum tulang belakang (Harrison, Bowman, & Polidori, 2014).

Asam askorbat yang masuk ke dalam SSP menggunakan transportasi yang lambat dari plasma ke *Cerebrospinal Fluid* (CSF) kemudian melintasi epitel *choroid plexus* menggunakan *Sodium Ascorbate Cotransporter-2* (SVCT2). Setelah itu asam askorbat akan masuk ke dalam *Cerebrospinal*, selanjutnya asam askorbat akan masuk ke dalam neuron menggunakan transporter SVCT2 (May, 2011).

Asam askorbat berperan penting dalam pembentukan norepinefrin. Pembentukan norepinefrin dibantu oleh dopamin dengan enzim *dopamin b-hidoksilase* serta menggunakan asam askorbat sebagai kofaktor. Norepinefrin digunakan sebagai neurotransmitter oleh ganglia simpatis untuk memobilisasi otak dalam pengaturan suasana hati. Bila terjadi defisiensi norepinefrin dalam tubuh maka akan mengakibatkan terjadinya depresi, perasaan cemas dan hiperaktif (May, Qu, & Meredith, 2012). Sehingga, asam askorbat dapat berpengaruh terhadap penanganan gangguan kesehatan mental.

Asam askorbat pada konsentrasi milimolar di area yang banyak mengandung neuron yaitu sistem saraf pusat yang berperan penting dalam memberikan fungsi neuromodulatori. Selain itu asam askorbat berperan penting untuk sintesis katekolamin yang akan membantu proses pembentukan dopamin dan norepinefrin (May et al., 2012).

Asam askorbat dalam sel saraf memiliki fungsi dalam pembentukan *myelin sheath* oleh sel *schwann*. Jika pembentukan *myelin sheath* terganggu, maka akan mengakibatkan susunan sel saraf menjadi tidak sempurna dan akan berdampak pada kejadian gangguan kesehatan mental. Asam askorbat berperan penting dalam pelepasan asetilkolin. Asetilkolin merupakan senyawa neurotransmitter di dalam sistem saraf dan paling banyak terdapat di dalam sistem saraf tepi. Asetilkolin yang dilepaskan dari sinaptosom ke veskula sinaptik akan menggunakan asam askorbat sebagai kofaktor. Dalam hal ini asam askorbat akan berfungsi untuk melakukan transmisi sinyal atau rangsangan yang diterima. Kemudian asetilkolin akan berdifusi di celah antar-sinapsis dan menstimulasi saraf-saraf lainnya. Asam askorbat juga memiliki peran fungsional dalam keseimbangan neurotransmisi glutamatergik sehingga akan mempengaruhi perasaan, emosi dan gangguan kesehatan mental (Moretti, 2017).

Dalam beberapa penelitian tentang asam askorbat masih belum jelas bagaimana mekanisme asam askorbat terhadap terjadinya penurunan gangguan kesehatan mental secara khusus (depresi, *anxiety*, demensia, autisme, gangguan aktif bipolar, cacat intelektual, dan *schizophrenia*), namun banyak beberapa penelitian yang menemukan bahwa adanya pengaruh asam askorbat dalam penurunan gangguan kesehatan mental, sehingga sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat mekanisme asam askorbat secara khusus dalam menurunkan gangguan kesehatan mental.

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari hasil *literature review* yang telah dilakukan pada 4 artikel bahwa asam askorbat merupakan mikronutrien memiliki potensi dalam penanganan gangguan kesehatan mental (autisme, *psychiatric disorders*, *schizophrenia*, dan *depression*) melalui pembentukan katekolamin, norepinefrin, *myelin sheath* oleh sel *schwann*, pelepasan asetilkolin dan keseimbangan glutamatergik. Sehingga dapat berdampak positif dengan menekan penurunan terjadinya gangguan kesehatan mental. Terdapatnya penurunan gangguan kesehatan mental pada 4 artikel tersebut disebabkan asupan asam askorbat yang cukup dan tinggi sedangkan pada sampel/subjek yang asupannya rendah tidak terjadi penurunan gangguan kesehatan mental. Namun masih belum ditemukan berapa jumlah kebutuhan asam askorbat yang optimal terhadap penurunan gangguan kesehatan mental apakah cukup sesuai dengan kebutuhan atau harus melebihi dari kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, D. M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10.
- Covarrubias-pinto, A., Acuña, A. I., & Beltrán, F. A. (2015). Old Things New View: Ascorbic Acid Protects the Brain in Neurodegenerative Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*, 28194–28217. <https://doi.org/10.3390/ijms161226095>
- Du, J., Cullen, J. J., & Buettner, G. R. (2012). Ascorbic acid: Chemistry, biology and the treatment of cancer. *BBA - Reviews on Cancer*, 1826(2), 443–457. <https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2012.06.003>
- Fraga, D. B., Paula, A., Olescowicz, G., Camargo, A., Pazini, F. L., Freitas, A. E., ... Rodrigues, S. (2019). Ascorbic acid presents rapid behavioral and hippocampal synaptic plasticity effects. *Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry*, 96(May 2019), 109757. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109757>
- Harrison, F. E., Bowman, G. L., & Polidori, M. C. (2014). Ascorbic Acid and the Brain: Rationale for the Use against Cognitive Decline. *nutrients*, 6, 1752–1781. <https://doi.org/10.3390/nu6041752>
- Khajehnasiri, F., Shahin, A., Seyed, M. B., Abdolamir, A., Sotoudeh, G., Khavanin, A., & Zamanian, Z. (2016). Are Supplementation of Omega-3 and Ascorbic Acid Effective in Reducing Oxidative Stress and Depression

- among Depressed Shift Workers? *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*, (May), 1–12. <https://doi.org/10.1024/0300-9831/a000249>
- Kim, S., Kim, J., Shin, I., Yoon, J., Yang, S. J., & Kim, S. (2017). Low dietary intake of n-3 fatty acids, niacin, folate, and vitamin C in Korean patients with schizophrenia and the development of dietary guidelines for schizophrenia. *Nutrition Research*. <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2017.07.001>
- Kocot, J., Luchowska-kocot, D., & Musik, I. (2017). Does Vitamin C Influence Neurodegenerative Diseases and Psychiatric Disorders? *Joanna. nutrients*, 9, 659. <https://doi.org/10.3390/nu9070659>
- May, J. M. (2011). *Themed Section : Transporters The SLC23 family of ascorbate transporters: ensuring that you get and keep your daily dose of vitamin C*. <https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01350.x>
- May, J. M., Qu, Z., & Meredith, M. E. (2012). Mechanisms of ascorbic acid stimulation of norepinephrine synthesis in neuronal cells. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 426(1), 148–152. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2012.08.054>
- Moretti, M. (2017). Ascorbic Acid to Manage Psychiatric Disorders. *CNS Drugs*. <https://doi.org/10.1007/s40263-017-0446-8>
- Pasaribu, S. F., Siahaan, G., Lestrina, D., Manggabarani, S., Gizi, L., Kesehatan, F., ... Korespondensi, P. (2019). Hubungan Asupan Vitamin A dan C dengan Kadar Timbal (Pb) pada Rambut dan Manifestasi Klinik Penyandang Autis. *Jurnal Dunia Gizi*, 2(1), 43–49.
- Rubio-lópez, N., Morales-suárez-varela, M., & Pico, Y. (2016). Nutrient Intake and Depression Symptoms in Spanish Children: The ANIVA Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph13030352>
- Sawicka-glazer, E., & Czuczwar, S. J. (2014). Vitamin C: A new auxiliary treatment of epilepsy? *Pharmacological Reports*. <https://doi.org/10.1016/j.pharep.2014.02.016>
- Tveden-nyborg, P., Vogt, L., Schjoldager, J. G., Jeannet, N., & Hasselholt, S. (2012). Maternal Vitamin C Deficiency during Pregnancy Persistently Impairs Hippocampal Neurogenesis in Offspring of Guinea Pigs. *PLOS ONE*, 7(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048488>
- Warner, T. A., Kang, J., Kennard, J. A., & Harrison, F. E. (2015). Low brain ascorbic acid increases susceptibility to seizures in mouse models of decreased brain ascorbic acid transport and Alzheimer ' s disease. *Epilepsy Research*, 110, 20–25. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2014.11.017>
- WHO. (2013). *Mental Health Action Plan 2013 – 2020*. Geneva.
- WHO. (2017a). *Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimates*. Geneva.
- WHO. (2017b). *Factsheet on Mental Disorders*. Geneva.