Karakteristik Individu Terhadap Timbal Darah Dan Dampaknya Pada Hb Pekerja Bengkel Oesapa

Agnes Rantesalu^{1✉}, Winioliski L.O. Rohi Bire²

^{1,2}Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia

¹rantesaluagnes@gmail.com / 0852 5502 8564

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 03 Mei 2020
Disetujui 19 Januari 2021
Di Publikasi 31 Mei 2021

Keywords:

lead, hemoglobin, workshop workers

DOI :

<https://doi.org/10.32763/juke.v13i2.212>

Abstrak

Latar Belakang: Pencemaran udara seperti polusi timbal melalui kendaraan bermotor dapat menimbulkan penurunan kadar hemoglobin (Hb) dan berbagai penyakit. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar timbal dalam darah dan karakteristik individu (umur, pendidikan, kebiasaan merokok, lama bekerja dan masa kerja) dengan kejadian anemia pada pekerja bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang. **Metode:** Metode yang digunakan untuk mengukur kadar logam timbal pada darah pekerja bengkel dengan alat spektrofotometer serapan atom, dan menggunakan *Easy Touch GC Hb* untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah. Sampel penelitian ini berjumlah 20 orang laki-laki petugas bengkel di kecamatan Oesapa. Pemeriksaan kadar Timbal (Pb) dilakukan dengan menggunakan AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) dan pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) dengan menggunakan *Easy Touch GCHb*. **Hasil:** Hasil Penelitian didapatkan dari 20 orang yang diteliti 1 orang (5%) memiliki kadar timbal yang tinggi dan kadar hemoglobin yang normal. Berdasarkan uji statistik, didapatkan kadar Hb dan kadar Pb terhadap karakteristik individu petugas bengkel tidak signifikan ($p > 0,05$), yaitu terhadap: umur ($p = 0,684$), lama merokok ($p = 0,577$), banyaknya konsumsi rokok ($p = 0,122$), lama bekerja ($p = 0,489$), dan masa kerja ($p = 0,706$). **Kesimpulan:** Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar Pb dengan kadar Hb.

The Individual Characteristics with Timbal Levels in Blood and Its Impact on Hb Mechanical Workshop Levels In Oesapa

Abstract

Background: Air pollution such as lead pollution through motorized vehicles can cause a decrease in hemoglobin (Hb) levels and various diseases. **Purpose:** This study aims to determine the relationship between blood lead levels and individual characteristics (age, education, smoking habits, length of work and years of service) and the incidence of anemia in workshop workers in Oesapa Village, Kupang City. **Method:** The method used to measure lead levels in the blood of workshop workers was using an atomic absorption spectrophotometer, and using *Easy Touch GC Hb* to determine hemoglobin levels in the blood. The research sample consisted of 20 male workshop officers in Oesapa sub-district. Checking the levels of Lead (Pb) was carried out using AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) and checking the levels of Hemoglobin (Hb) using *Easy Touch GCHb*. **Results:** The results showed that from 20 people studied, 1 person (5%) had high lead levels and normal hemoglobin levels. Based on the statistical test, it was found that the Hb and Pb levels on the individual characteristics of the workshop staff were not significant ($p > 0.05$), namely: age ($p = 0.684$), smoking duration ($p = 0.577$), number of cigarette consumption ($p = 0.122$), length of work ($p = 0.489$), and years of service ($p = 0.706$). **Conclusions:** The results of statistical tests showed that there was no significant relationship between Pb levels and Hb levels.

Alamat korespondensi:
Poltekkes Kemenkes Kupang, Kupang – Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: rantesaluagnes@gmail.com

ISSN 2597-7520

© 2021 Poltekkes Kemenkes Ternate

Pendahuluan

Salah satu polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah timbal (Pb). Timbal merupakan polutan udara utama di udara perkotaan selain sulfur dioksida (SO_2), nitrogen oksida (NO_x), dan karbon monoksida (CO). Dampak paparan timbal terhadap kesehatan adalah kerusakan ginjal, hipertensi, anemia, kerusakan saraf pusat, keguguran janin, menurunkan IQ anak (Takwa et al., 2017). Timbal banyak digunakan terutama pada bahan bakar bensin. Timbal ditambahkan ke dalam bensin yang berkualitas rendah untuk meningkatkan nilai oktan guna mencegah terjadinya letupan pada mesin. Timbal yang tercampur dengan bahan bakar akan bercampur dengan oli dan melalui serangkaian proses di dalam mesin maka timbal akan keluar dari knalpot bersama dengan emisi gas buang kendaraan (Azhari, 2014).

Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dari udara, kontak dengan kulit, kontak dengan mata dan lewat prenatal. Secara umum, dampak dari terpapar timbal adalah pusing, kehilangan selera makan, sakit kepala, sukar tidur dan lelah (Rosita & Widiarti, 2018). Timbal yang masuk ke dalam tubuh juga dapat menghambat kerja dari beberapa enzim yang terlibat dalam biosintesis heme. Kadar timbal yang tinggi dalam darah, dapat menyebabkan terjadinya penurunan hemoglobin dalam tubuh sehingga berpotensi terjadinya anemia (Azhari, 2014).

Secara umum, dampak negatif dari pencemaran oleh timbal sangat tinggi terhadap kelompok masyarakat yang sering dan lama kontak terhadap sumber pencemaran timbal, yang disebut kelompok masyarakat resiko tinggi (high risk). Kelompok tersebut antara lain adalah pegawai SPBU, pekerja bengkel, polisi lalu lintas, tukang parkir dan lain-lain (Samsuar et al., 2017).

Penelitian Rosmiarti dan Amalia (2014) dalam (Niman, 2019) menyatakan bahwa kadar timbal tertinggi dalam darah tukang ojek di Palembang adalah $70,98 \mu\text{g/dL}$, dan berdasarkan hasil penelitian Samsuar et al. (2017), kadar timbal dalam rambut pekerja bengkel tambal ban yaitu $481 \mu\text{g/dL}$. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sadipun (2018) dalam (Niman, 2019) menunjukkan kadar timbal dalam darah pekerja mekanik bengkel di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang sebesar $20,20 \mu\text{g/dL}$. Sedangkan kadar timbal tertinggi dalam darah penjual klepon yang merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pencemaran logam timbal yang berasal dari buangan gas kendaraan bermotor adalah $0,73 \text{ ppm}$ (Kustiningsih et al., 2017). Nilai kadar Pb dalam darah pengemudi Lyn TV di kota Surabaya berdasarkan hasil yang diperoleh Witcahyo (2013) adalah rata-rata $8,7428 \mu\text{g/dL}$.

Bengkel merupakan salah satu tempat terjadinya pencemaran dari sekian banyak tempat, dan terjadi pembuangan gas atau limbah dari kendaraan yang mengandung logam berat misalnya timbal yang dapat membahayakan kesehatan pekerja bengkel sendiri. Hal ini dapat terjadi karena setiap kendaraan yang diperbaiki di bengkel tersebut dilakukan pengelasan sehingga terjadi pembakaran dan menyebabkan pekerja bengkel berpotensi terpapar timbal (Ramadhani, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Muliyadi et al. (2015), menunjukkan bahwa timbal darah dipengaruhi oleh timbal di udara.

Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang cukup ramai dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka semakin banyak pula jasa perbengkelan yang ada di Kelurahan Oesapa yang dikunjungi. Meningkatnya pengunjung ini berakibat pada tingginya tingkat paparan timbal pada pekerja bengkel. Keadaan ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran pekerja bengkel itu sendiri terhadap pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Hubungan Karakteristik Individu terhadap Kadar Timbal dalam Darah dan Dampaknya pada Kadar Hb Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Oesapa pada bulan September-Oktober 2019. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Pekerja bengkel yang dijadikan koresponden adalah pekerja bengkel yang bersedia dijadikan subyek penelitian dan menandatangani informed consent. Jumlah sampel sebanyak 20 orang dengan menggunakan SPSS pada pengolahan datanya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi yaitu menghubungkan antara kadar Hb dan kadar Pb terhadap karakteristik individu petugas bengkel. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Spearman. Analisis sampel dilakukan dengan cara sampel sebanyak 1 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL kemudian didestruksi dengan campuran HClO_4 : HNO_3 (1:5) hingga membentuk cairan hampir jernih. Mengencerkan sampel dalam labu ukur 50 mL dengan air deionisasi hingga tanda batas. Sampel kemudian dianalisis dengan AAS (Spektrofotometer Serapan Atom).

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran kadar timbal dalam darah ini dilakukan secara spektrofotometri serapan atom dengan destruksi basah menggunakan HNO_3 pa dan HClO_4 pa. Tujuan dilakukan destruksi yaitu untuk mendapatkan timbal dalam sampel dan

memisahkannya dari senyawa-senyawa organik lainnya, di mana HNO_3 dikombinasikan dengan HClO_4 sebagai campuran asam untuk mendestruksi, dengan HClO_4 bertindak sebagai oksidan yang kuat (oksidator) untuk membantu HNO_3 mendekomposisi sampel darah. Larutan hasil destruksi kemudian dianalisis dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 258 nm. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan kadar timbal pada setiap sampel, seperti yang tertera pada Tabel 1.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi timbal tertinggi pada sampel No. 10

dengan kadar timbal 47,3 $\mu\text{g/dL}$ dengan masa kerja 1,25 tahun dan yang terendah pada sampel No.1 yaitu 0,3 $\mu\text{g/dL}$ dengan masa kerja 1 bulan. Rata-rata konsentrasi timbal dalam darah pekerja bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang adalah 9,8 $\mu\text{g/dL}$. Berdasarkan hasil rata-rata nilai konsentrasinya masih dalam batas normal kadar timbal dalam darah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1406/MENKES/XI/2002 tentang standar kadar timbal dalam darah yaitu 25 $\mu\text{g/dL}$.

Tabel 1. Hasil Pengukuran kadar Pb nilai Hb terhadap Karakteristik Individu Petugas Bengkel

Variabel	Kadar Pb ($\mu\text{g/dL}$)	p	Kadar Hb (g/dL)	p
Umur (tahun)	9,8	0,684	14,94	0,447
Lama merokok (tahun)	9,8	0,577	14,94	0,347
Banyaknya konsumsi rokok(batang/hari)	9,8	0,122	14,94	0,386
Lama bekerja (jam/hari)	9,8	0,489	14,94	0,131
Masa kerja (tahun)	9,8	0,706	14,94	0,257

Timbal yang masuk ke dalam tubuh setiap hari akan diserap dan diabsorpsi. Paparan timbal merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat toksik terhadap manusia baik yang masuk ke dalam tubuh lewat inhalasi, saluran pernapasan, maupun penetrasi lewat kulit. Timbal yang masuk ke dalam tubuh normalnya 0,3 $\mu\text{g/dL}$ per hari, jika pemasukan timbal dalam tubuh sebanyak 2,5 $\mu\text{g/dL}$ per hari maka butuh waktu 3 sampai 6 tahun untuk mendapatkan efek toksik, sedangkan apabila pemasukan timbal 3,5 $\mu\text{g/dL}$ per hari maka butuh waktu hanya beberapa bulan saja untuk terakumulasinya timbal dalam tubuh (Fibrianti &

Azizah, 2016). Kadar Hb dan kadar Pb terhadap karakteristik individu petugas bengkel tidak signifikan ($p > 0,05$) Tidak ada hubungan antara kadar Pb dan kadar Hb terhadap umur, lama merokok, banyaknya konsumsi rokok per hari, lama bekerja per hari dan masa kerja per tahun. Penggunaan APD sendiri dalam bekerja didapatkan hasil penelitian dari Sari et al. (2019) bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan keterpaparan logam timbal (Pb) pada petugas pembayaran retribusi (TPR) Dinas perhubungan di terminal Rajabasa Bandar Lampung.

Tabel 2. Perbandingan Masa Kerja dengan Rata-Rata Kadar Timbal dalam Darah Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Rerata Kadar Pb ($\mu\text{g/dL}$)	Rerata Kadar Hb (g/dL)
1	0,01	1	0,3	16,1
2	0,08	1	10,1	15,6
3	0,17	1	8,2	16,2
4	0,33	1	8,0	11,9
5	0,42	2	2,7	15,7
6	0,50	4	9,0	14,1
7	0,75	1	7,9	12,3
8	1,00	2	30,2	15,3
9	1,08	1	2,9	16,1

10	1,25	1	14,0	14,6
11	1,50	1	9,9	14,2
12	2,00	1	4,4	15,8
13	3,00	1	12,7	18,2
14	5,00	1	1,8	13,1
15	9,00	1	14,4	16,4

Pada penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan antara kadar timbal dan kadar Hb terhadap masa kerja ($p>0,05$) (Tabel 1). Rerata kadar Hb tertinggi yaitu pada 18,2 g/dL dengan rerata Pb sebesar 12,7 $\mu\text{g/dL}$. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Huwaida et al. (2016), dan Qoriah et al. (2015) yaitu tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kadar Pb dalam darah pekerja di perusahaan rokok. Hasil Rosita & Widiarti (2018) juga menyebutkan tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kadar hemoglobin melalui kadar timbal dalam darah. Begitupula dengan hasil yang didapatkan oleh Annashr et al., (2020) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar timbal dalam darah dan profil darah (kadar Hb, eritrosit, trombosit dan hematokrit). Hasil penelitian lain dari Suwarja et al. (2019) menunjukan tidak ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan kadar Pb dalam urine. Sedangkan hasil penelitian dari Surip, et. al (2013)

subyek yang mempunyai kadar timbal dalam darah tidak normal ($>30 \mu\text{g/ml}$) mempunyai risiko kadar haemoglobinnya di bawah normal ($<12 \text{ gr.dL}$) dibanding dengan subyek yang kadar timbal dalam darahnya normal.

Pada hasil yang didapatkan, terdapat pekerja (dengan masa kerja 1 tahun) yang memiliki kadar Pb lebih tinggi dibandingkan pekerja lain yang bekerja lebih lama (9 tahun). Hal ini dipengaruhi juga dari kebiasaan, konsumsi makanan juga kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Stamara et al. (2020) juga menunjukkan masa kerja operator yang bekerja <4 tahun, yang memiliki kadar ambang batas timbal dalam darah sekitar $30 \mu\text{g}/100 \text{ mL}$ atau tidak melebihi ambang batas maksimal nilai normal menurut depkes. Sedangkan hasil penelitian Lestari dan Purwanti (2020) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara lama paparan dan kadar timbal pada pekerja cat.

Tabel 3. Perbandingan Usia dengan Rata-Rata Kadar Timbal dalam Darah Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Rerata Kadar Pb ($\mu\text{g/dL}$)	Rerata Kadar Hb (g/dL)
1	16	1	10,1	15,6
2	17	1	13,0	16,5
3	18	2	7,1	15,3
4	19	3	4,2	16,2
5	20	1	8,0	11,9
6	21	2	8,9	14,5
7	22	2	5,0	14,2
8	23	2	28,6	14,2
9	24	2	2,2	16,6
10	25	2	6,5	13,0
11	26	1	14,4	16,4
12	33	1	12,7	18,2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden diperoleh yang memiliki rerata kadar Pb tertinggi yaitu responden umur 23 tahun sebanyak 2 dengan rerata kadar Hb normal. Dari penelitian ini diketahui tidak ada hubungan antara kadar timbal dan kadar Hb terhadap umur ($p>0,05$) (Lampiran 5). Hasil yang sama juga didapatkan oleh Huwaida et al. (2016), yaitu tidak ada hubungan antara usia dengan kadar Pb dalam

darah pekerja di perusahaan rokok. Hasil Rosita & Widiarti (2018) juga menyebutkan tidak terdapat hubungan antara usia dengan kadar hemoglobin melalui kadar timbal dalam darah. Syakbanah (2018) menunjukkan hasil terdapat perbedaan kadar Hb kedua kelompok polisi yang bekerja di kantor dan di lapangan diketahui bahwa kelompok usia tua (≥ 40 tahun) mempunyai risiko memiliki kadar Hb darah $< 13 \text{ g/dl}$ jika dibandingkan

dengan kelompok umur muda (< 40 tahun). Dikarenakan umur merupakan faktor penentu

kondisi metabolisme tubuh seseorang.

Tabel 4. Perbandingan Tingkat Pendidikan dengan Rata-Rata Kadar Timbal dalam Darah Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Rerata Kadar Pb (µg/dL)	Rerata Kadar Hb (g/dL)
1	S1	7	6,6	15,7
2	SMA	13	11,5	14,5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden diperoleh kelompok yang memiliki rerata kadar Pb tertinggi yaitu kelompok tingkat pendidikan SMA sebanyak 13 orang (11,5 µg/dL) dengan rerata kadar Hb normal. Dari penelitian ini diketahui tidak ada hubungan antara kadar timbal dan kadar Hb terhadap tingkat pendidikan ($p>0,05$) (Lampiran 5). Hasil yang sama juga didapatkan oleh Huwaida et al. (2016), yaitu tidak

ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kadar Pb dalam darah pekerja di perusahaan rokok. Walaupun beberapa responden tahu pengaruh kadar timbal dan Hb pada darah, responden tetap melakukan hal yang sama seperti rekan kerjanya (misalnya kebiasaan merokok dan penggunaan APD). Sehingga tidak ada hubungan antara kadar timbal dan kadar Hb terhadap tingkat pendidikan.

Tabel 5. Perbandingan Lama Merokok dengan Rata-Rata Kadar Timbal dalam Darah Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang

No	Lama Merokok (tahun)	Jumlah	Rerata Kadar Pb (µg/dL)	Rerata Kadar Hb (g/dL)
1	0	4	12,5	14,9
2	0,17	1	8,0	11,9
3	1	3	4,1	14,9
4	3	1	12,3	17,4
5	4	2	6,9	14,4
6	5	2	25,9	15,0
7	6	1	14,0	14,6
8	8	2	6,5	13,0
9	10	3	6,0	16,5

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 20 responden diperoleh kelompok suka merokok dengan waktu merokok yang sudah lama, memiliki rerata kadar Hb yang masih normal yaitu 16,5 g/dL dan rerata kadar Pb 6,0 µg/dL. Sedangkan kelompok yang tidak merokok memiliki rerata kadar Hb 14,9 g/dL dan rerata kadar Pb 12,5 µg/dL. Berdasarkan hasil diketahui tidak ada hubungan antara kadar timbal dan kadar Hb terhadap lama merokok ($p>0,05$) (Lampiran 5). Hasil Rosita & Widiarti (2018) menyebutkan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin melalui kadar timbal

dalam darah. Walaupun hasil ini berbeda dengan teori, namun hal lain juga mempengaruhi hasil seperti kebiasaan konsumsi makan bergizi, multivitamin, dan kemungkinan responden sebagai perokok pasif yang tidak mengonsumsi rokok secara langsung. Sedangkan hasil penelitian dari Hasan et al. (2013) menunjukkan bahwa ada hubungan jenis kelamin dan kebiasaan merokok dengan kadar timbal dalam darah. Hasil penelitian Sari et al. (2016) juga menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kadar Pb dalam darah.

Tabel 6. Perbandingan Banyaknya Konsumsi Rokok per Hari dengan Rata-Rata Kadar Timbal dalam Darah Pekerja Bengkel di Kelurahan Oesapa Kota Kupang

No	Banyaknya konsumsi rokok per hari (batang)	Jumlah	Rerata Kadar Pb (µg/dL)	Rerata Kadar Hb (g/dL)
1	0	4	12,5	14,9

2	2	1	8,0	11,9
3	3	1	8,2	16,2
4	4	1	47,3	14,1
5	5	4	7,5	15,8
6	6	1	5,6	12,5
7	7	2	8,7	15,6
8	11	1	12,7	18,2
9	12	4	3,2	14,4
10	24	1	3,9	14,3

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data penelitian tidak terdistribusi normal sehingga uji analisis statistik yang digunakan yaitu uji Spearman. Berdasarkan uji statistik, didapatkan kadar Hb dan kadar Pb terhadap karakteristi individu petugas bengkel tidak signifikan ($p>0,05$). Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kadar Hb dan Pb terhadap

karakteristik petugas bengkel. Karakteristik petugas bengkel seperti kebiasaan merokok, lama kerja, dan lain-lain menunjukkan tidak ada hubungan dengan kadar Hb dan Pb, bisa saja disebabkan karena kebiasaan dari responden yang mempengaruhi responden lain seperti responden yang menjadi perokok pasif.

Kesimpulan

Hasil Penelitian didapatkan dari 20 orang yang diteliti 1 orang (5%) memiliki kadar timbal yang tinggi dan kadar hemoglobin yang normal. Rerata kadar Timbal (Pb) dalam darah pekerja bengkel di kelurahan Oesapa adalah 9,8 $\mu\text{g/dL}$ dengan kadar terendah 0,3 $\mu\text{g/dL}$ dan tertinggi 47,3 $\mu\text{g/dL}$.

*5Rerata kadar Timbal (Pb) tidak melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan yaitu 25 $\mu\text{g/dL}$. Rerata kadar Hemoglobin (Hb) pada petugas bengkel masih dikategorikan normal. Sehingga ada beberapa responden dengan kadar

Hb normal dan rendah. Berdasarkan uji statistik, didapatkan kadar Hb dan kadar Pb terhadap karakteristi individu petugas bengkel tidak signifikan ($p>0,05$). Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kadar Hb dan Pb terhadap karakteristik petugas bengkel. Berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh

Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih diperluas wilayah pengambilan sampel sehingga didapatkan responden yang lebih banyak dan gambaran yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Annashr, N. N., Djaja, I. M., & Kusharisupeni. (2020). Hubungan antara kadar timbal dalam darah dan profil darah pada anak Sekolah Dasar (SD) Cinangka, Kabupaten Bogor. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada*, 20(2), 95–106.
- Azhari, F. (2014). *Hubungan Kadar Timbal Pada Urin dan Karakteristik Individu dengan Kejadian Anemia Pada Pedagang Wanita Di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur Tahun 2014*.
- Fibrianti, L. D., & Azizah, R. (2016). Characteristic, Levels of lead in the blood, and hypertension of Workers Batteries Home Industry at Talun Village Sukodadi District Lamongan Regency. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 8(1), 92–102. <https://doi.org/10.20473/jkl.v8i1.2015.92-102>
- Hasan, W., Matondang, A. R., Syahrin, A., & Wahyuni, C. U. (2013). Pengaruh Jenis Kelamin dan Kebiasaan Merokok terhadap Kadar Timbal Darah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 21.
- Huwaida, T. A., Rahardjo, M., & Setiani, O. (2016). Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Konsentrasi Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Pekerja Di Perusahaan Rokok Wido Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(3), 911–920.
- Kustiningsih, Y., Fitriyanti, N., & Nurlailah, N. (2017). Kadar Logam Timbal (Pb) dalam Darah Penjual Klepon. *Medical Laboratory Technology Journal*, 3(2), 47–52. <https://doi.org/10.31964/mltj.v3i2.168>
- Lestari, D., & Purwanti, A. (2020). The Modifying Factor of Lead Exposure Time with Blood Lead Levels on Adulterated Paint Worker. *Asian Journal of Applied Sciences*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.24203/ajas.v8i2.6099>
- Mentri Kesehatan Republik Indonesia. (2002).

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1406/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Standar Pemeriksaan Kadar Timah Hitam pada Spesimen Biomarker Manusia* (Vol. 20, Issue 4).
- Muliyadi, Mukono, H. J., & H., N. (2015). Paparan Timbal Udara Terhadap Timbal Darah, Hemoglobin, Cystatin C Serum Pekerja Pengecatan Mobil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 87–95. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3519>
- Niman, M. A. (2019). *Gambaran kadar timbal dalam darah pekerja bengkel di kelurahan oesapa kota kupang karya tulis ilmiah*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- Qoriah, D., Setiani, O., & Dewanti, N. (2015). Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Pekerja Industri Pengecoran Logam Cv. Bonjor Jaya Di Desa Batur, Ceper, Klaten. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3), 688–701.
- Rosita, B., & Widiarti, L. (2018). Hubungan Toksisitas Timbal (Pb) Dalam Darah Dengan Hemoglobin Pekerja Pengecatan Motor Pekanbaru. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN: 2622-2256*, 1(1), 3.
- Samsuar, S., Kanedi, M., Pebrice, S., & P, W. A. (2017). Analisis Kadar Timbal (Pb) pada Rambut Pekerja Bengkel Tambal Ban dan Ikan Mas di Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung Secara Spektrofotometri Serapan Atom. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 91–97. <https://doi.org/10.26630/jk.v8i1.406>
- Sari, M., Setiani, O., & Joko, T. (2016). Hubungan Karakteristik Individu Dan Pemakaian Alat Pelindung Diri (Apd) Dengan Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Pekerja Pengecatan Di Industri Karoseri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(3), 817–824.
- Sari, N. N., Putri, L. N., & Agata, A. (2019). Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Dengan Keterpaparan Logam Timbal (Pb) Pada Petugas Tanda Pembayaran Retribusi (Tpr) Dinas Perhubungan di Terminal Rajabasa Bandar Lampung. *Bali Medika Jurnal*, 6(1), 30–37. <https://doi.org/10.36376/bmj.v6i1.63>
- Stamara, G., Rinawati, D., & Barlian, B. (2020). Identifikasi Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Petugas Operator Spbu 34-42115 Kota Serang Identification Of Blood Lead Level Among Spbu Operator Officers 34-42115 In Serang City. *Medikes*, 7(1), 1–8.
- Surip, Setiani, O., & Rahfiludin, M. Z. (2013). Hubungan Antara Kadar Timbal dalam Darah dengan Kadar Hemoglobin pada Wanita Usia Subur di Lingkungan Industri Peleburan Loga Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal The Association Between Blood Lead Level (BLL) with Hemoglobin Level on Women of Childbearing. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 12(2), 166–170.
- Suwarja, Sopiti, J., & Rokot, A. (2019). Kadar timbal (Pb) dalam urine terhadap lamanya pedagang kaki lima berjualan di pasar 45 kota manado timbal levels (Pb) in urine on the long time of five traders trading in the market 45 manado city. *Jurnal Poltekkes*, 2, 87–92. <https://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/jkl/article/view/671>
- Syakbanah, N. L. (2018). Hubungan Kadar Pb udara dan Karakteristik Responden terhadap Kadar Pb Darah Tukang Becak di Gresik. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(1), 92–103.
- Takwa, A., Bujawati, E., & Mallapiang, F. (2017). Gambaran Kadar Timbal Dalam Urin dan Kejadian Gingival Lead Line Pada Gusi Anak Jalanan Di Flyover Jl. AP. Pettarani. *Journal Higiene*, 3(2), 116. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=522043&val=10676&title=Gambaran Kadar Timbal Dalam Urin dan Kejadian Gingival Lead Line Pada Gusi Anak Jalanan Di Flyover Jl. AP. Pettarani Makassar>
- Witcahyo, E. (2013). Kadar Timbal Dalam Darah Dan Kebijakan Pencegahan Pada Pengemudi Lynkadar Timbal Dalam Darah Dan Kebijakan Pencegahan Pada Pengemudi Layanan Tv Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>